PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-208262

(43) Date of publication of application: 28.07.2000

(51)Int.CI.

H05B 33/14

C09K 11/06

H05B 33/22

(21) Application number: 11-007051

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

13.01.1999

(72)Inventor: AZUMAGUCHI TATSU


ISHIKAWA HITOSHI MORIOKA YUKIKO

ODA ATSUSHI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescent element with high brightness. SOLUTION: As a component material for an organic electroluminescent element, a specific pyrromethene metallic complex compound represented in a formula is used. In the formula, M represents an n valence metal ion; n is any one of 1, 2 and 3. R1 to R7 respectively independently express a hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl group, a substituted or non-substituted amino group, a nitro group, a cyano group, a substituted or non-substituted alkenyl group, a substituted or non-substituted or non-substituted alkenyl group, a substituted alkoxy group, a substituted or non-substituted aromatic hydrocarbon group, a substituted or non-substituted aromatic hydrocarbon group, a substituted or non-substituted aromatic heterocyclic group, a substituted or non-substituted aralkyl group, a substituted or non-substituted or non-substituted or non-substituted or non-substituted aralkyl group, a substituted or non-substituted o



substituted or non-substituted aralkyl group, a substituted or non-substituted aryloxy group, a substituted or non-substituted alkoxycarbonyl group, and a carboxyl group. R1 to R7 may form a ring with two thereof.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3159259

[Date of registration]

16.02.2001

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

18.12.2002

* NOTICES *


Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2. **** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] the organic electroluminescent element which has the monostromatic or the two or more layers organic thin film layer which contains a luminous layer between cathode and an anode plate -- setting -- the aforementioned organic thin film layer -- at least -- much more -- alike -- general formula [-izing 1]: [Formula 1]



(M expresses the metal ion of n ** among a chemical formula.) Independently R1-R7, respectively A hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl, The alkyl group which is not replaced [the amino group which is not replaced / substitution or /, a nitro group, a cyano group, substitution, or], The cycloalkyl machine which is not replaced [the ARUKENIRU machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [the alkoxy group which is not replaced / substitution or /, substitution or], The alkoxy carbonyl group which is not replaced [the aryloxy group which is not replaced / the aralkyl machine which is not replaced / the aromatic heterocycle machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or /, substitution, or /, substitution, or] and a carboxyl group are expressed. Moreover, R1-R7 may form the ring by two of them. n is 1, 2, or 3. Organic electroluminescent element characterized for the PIROMETEN metal complex compound shown by independent or organic electroluminescent element according to claim 1 characterized by containing as mixture about the compound which has the aforementioned luminous layer and is expressed with the aforementioned general formula [-izing 1] to the aforementioned luminous layer.

[Claim 3] The aforementioned organic thin film layer is independent or organic electroluminescent element according to claim 1 characterized by containing as mixture about the compound which has an electron hole transporting bed containing electron hole transportation material, and is expressed with the aforementioned general formula [-izing 1] to the aforementioned electron hole transporting bed.

[Claim 4] The aforementioned organic thin film layer is independent or organic electroluminescent element according to claim 1 characterized by containing as mixture about the compound which has an electronic transporting bed containing electronic transportation material, and is expressed with the aforementioned general formula [-izing 1] to the aforementioned electronic transporting bed.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the organic electroluminescent element excellent in the luminescence property. [0002]

[Description of the Prior Art] An organic electroluminescence (EL) element is a spontaneous light-corpuscle child using the principle in which the fluorescence nature matter emits light by the recombination energy of the electron hole poured in from the anode plate, and the electron poured in from cathode by impressing electric field.

[0003] Since the report (C. W.Tang, S.A.VanSlyke, applied physics Letters (Applied Physics Letters), 51 volumes, 913 pages, 1987, etc.) of the low-battery drive organic EL element by the laminating type element by C.W.Tang and others of Eastman Kodak Co. was made, research on the organic EL element which makes an organic material a component has been done briskly. [0004] Tang and others uses tris (8-hydroxy quinolinol aluminum) for the luminous layer, and it uses the triphenyl diamine derivative for the electron hole transporting bed. As an advantage of a laminated structure, raising the injection efficiency of the electron hole to a luminous layer, raising the generation efficiency of the exciton which blocks the electron poured in from cathode and is generated by reunion, shutting up the exciton generated within the luminous layer, etc. are mentioned.

[0005] As element structure of an organic EL element, the three-layer type of the two-layer type of an electron hole transportation (pouring) layer and an electronic transportability luminous layer or an electron hole transportation (pouring) layer, a luminous layer, and an electronic transportation (pouring) layer etc. is well known like this example.

[0006] In such a laminating type constituent child, in order to raise the poured-in recombination efficiency of an electron hole and an electron, the device of element structure or the formation method is made.

[0007] They are the 4,4',4"-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine which is a starburst molecule as an electron hole transportability material, and N and N'-diphenyl. - Triphenylamine derivatives and aromatic diamine derivatives, such as an N, N'-screw (3-methylphenyl)-[1 and 1'-biphenyl]-4, and 4'-diamine, are known well (for example, JP,8-20771,A, JP,8-40995,A, JP,8-40997,A, the official report publication-number No. 543397 [eight to] official report, JP,8-87122,A, etc.).

[0008] As an electronic transportability material, the OKISA diazole derivative, the triazole derivative, etc. are known well.

[0009] Moreover, as a luminescent material, luminescent material, such as chelate complexes, such as a tris (8-quinolinolato) aluminum complex, a coumarin derivative, a tetrapod phenyl butadiene derivative, a screw styryl arylene derivative, and an OKISA diazole derivative, is known, it is reported that luminescence of the visible region to blue shell red is obtained also for those luminescent color, and realization of a color display element is expected (for example, JP,8-239655,A, JP,7-138561,A, JP,3-200289,A, etc.).

[0010] Moreover, PIROMETEN-BF2 complex is indicated by JP,9-289081,A as a luminescent material.


[0011]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Although high brightness and the long lasting organic EL element are indicated or reported by recently, it cannot still necessarily be said as sufficient thing. Therefore, the material development which shows high performance is called for strongly. The purpose of this invention is to offer the organic EL element of high brightness. [0012]

[Means for Solving the Problem] In order that this invention persons may solve the aforementioned technical problem, as a result of inquiring wholeheartedly, it found out that the organic EL element produced using a specific PIROMETEN metal complex compound as a luminescent material carried out high brightness luminescence conventionally.

[0013] Moreover, as for the aforementioned material, it turns out that it has high carrier transportability, and the organic EL element produced using the mixed thin film with the organic EL element which produced the aforementioned material as electron hole transportation material or an electronic transportation material and the aforementioned material and other electron hole transportation material, or electronic transportation material found out that high brightness luminescence was shown conventionally, and resulted in this invention.

[0014] namely, the organic electroluminescent element which has the monostromatic or the two or more layers organic thin film layer in which this invention contains a luminous layer between cathode and an anode plate -- setting -- the aforementioned organic thin film layer -- at least -- much more -- alike -- general formula [-izing 2]: -- [Formula 2]



(M expresses the metal ion of n ** among a formula.) n is 1, 2, or 3. Independently R1-R7, respectively A hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl, The alkyl group which is not replaced [the amino group which is not replaced / substitution or /, a nitro group, a cyano group, substitution, or], The cycloalkyl machine which is not replaced [the alkenyl machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [the alkoxy group which is not replaced / substitution or /, substitution or], The alkoxy carbonyl group which is not replaced [the aryloxy group which is not replaced / the aralkyl machine which is not replaced / the aromatic heterocycle machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or /, substitution, or] and a carboxyl group are expressed. Moreover, R1-R7 may form the ring by two of them. They are independent or the organic electroluminescent element characterized by containing with mixture about the PIROMETEN metal complex compound shown.

[0015] Moreover, this invention has a luminous layer at least as the aforementioned organic thin film layer, and is independent or organic electroluminescent element characterized by containing as mixture about the compound by which this luminous layer is expressed with a general formula [-izing 2].

[0016] Moreover, this invention has an electron hole transporting bed at least as the aforementioned organic thin film layer, and is independent or organic electroluminescent element characterized by containing as mixture about the compound by which this luminous layer is expressed with a general formula [-izing 2].

[0017] Moreover, this invention has an electronic transporting bed at least as the aforementioned organic thin film layer, and is independent or organic electroluminescent element characterized by containing as mixture about the compound by which this luminous layer is expressed with a general formula [-izing 2].

[0018]

connection with this invention is a compound which has the structure expressed with a general formula [-izing 2]. (M expresses the metal ion of n ** among a formula.) n consists of 1, 2, or 3. Independently R1-R7, respectively A hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl, The alkyl group which is not replaced [the amino group which is not replaced / substitution or /, a nitro group, a cyano group, substitution, or], The cycloalkyl machine which is not replaced [the ARUKENIRU machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [the alkoxy group which is not replaced / substitution or /, substitution or]. The alkoxy carbonyl group which is not replaced [the aryloxy group which is not replaced / the aralkyl machine which is not replaced / the aromatic heterocycle machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or /, substitution, or /, substitution, or] and a carboxyl group are expressed. Moreover, R1-R7 may form the ring by two of them. [0019] As a metal which can be used for M which shows the metal ion of n ** Aluminum, beryllium, a bismuth, cadmium, a cerium, cobalt, Copper, iron, a gallium, germanium, mercury, an indium, a lanthanum, magnesium, Molybdenum, niobium, antimony, a scandium, tin, a tantalum, Thorium, titanium, uranium, a tungsten, a zirconium, vanadium, Although zinc, silver, gold, platinum, chromium, manganese, an yttrium, nickel, palladium, lead, a selenium, a tellurium, a thallium, calcium, strontium, barium, neodium, europium, and an erbium are mentioned, it is not restricted to these. [0020] Independently R1-R7, respectively A hydrogen atom, a halogen atom, a hydroxyl, The alkyl group which is not replaced [the amino group which is not replaced / substitution or /, a nitro group, a cyano group, substitution, or], The cycloalkyl machine which is not replaced [the ARUKENIRU machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or], The aromatichydrocarbon machine which is not replaced [the alkoxy group which is not replaced / substitution or /, substitution or], The alkoxy carbonyl group which is not replaced [the aryloxy group which is not replaced / the aralkyl machine which is not replaced / the aromatic heterocycle machine which is not replaced / substitution or /, substitution, or /, substitution, or /, substitution, or] and a carboxyl group are expressed. Moreover, R1-R7 may form the ring by two of them. [0021] A fluorine, chlorine, a bromine, and iodine are mentioned as a halogen atom. [0022] the amino group which is not replaced [substitution or] is expressed as -NX 1X2 -independently as X1 and X2, respectively A hydrogen atom, a methyl group, an ethyl group, a propyl group, an isopropyl machine, n-butyl, s-butyl, an isobutyl machine, t-butyl, n-pentyl machine, n-hexyl machine, n-heptyl machine, n-octyl machine, a hydroxymethyl group, 1hydroxyethyl machine, 2-hydroxyethyl machine, a 2-hydroxy isobutyl machine, 1, 2dihydroxyethyl machine, 1, 3-dihydroxy isopropyl machine, 2, a 3-dihydroxy-t-butyl, 1, 2, 3trihydroxy propyl group, a chloro methyl group, 1-chloro ethyl group, 2-chloro ethyl group, 2chloro isobutyl machine, 1, 2-dichloro ethyl group, 1, 3-dichloro isopropyl machine, 2, a 3dichloro-t-butyl, 1, 2, 3-TORIKURORO propyl group, a bromomethyl machine, 1-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO isobutyl machine, 1, 2-dibromo ethyl group, 1, 3-dibromo isopropyl machine, 2, a 3-dibromo t-butyl, 1, 2, 3-TORIBUROMO propyl group, an iodine methyl group, 1-iodine ethyl group, 2-iodine ethyl group, 2-iodine isobutyl machine, 1, 2diiodo ethyl group, 1, 3-diiodo isopropyl machine, 2, a 3-diiodo t-butyl, 1, 2, 3-triiodo propyl group, an aminomethyl machine, 1-aminoethyl machine, 2-aminoethyl machine, a 2-amino isobutyl machine, 1, 2-diamino ethyl group, 1, 3-diamino isopropyl machine, 2, a 3-diamino tbutyl, 1, 2, 3-triamino propyl group, a cyano methyl group, 1-cyano ethyl group, 2-cyano ethyl group, 2-cyano isobutyl machine, 1, 2-dicyano ethyl group, 1, 3-dicyano isopropyl machine, 2, a 3dicyano t-butyl, 1, 2, 3-tricyanopropyl machine, a nitro methyl group, 1-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine isobutyl machine, 1, 2-dinitro ethyl group, 1, 3dinitro isopropyl machine, 2, a 3-dinitro t-butyl, 1, 2, a 3-trinitro propyl group, a phenyl group, 1naphthyl group, 2-naphthyl group, 1-anthryl machine, 2-anthryl machine, 9-anthryl machine, 1phenan tolyl group, 2-phenan tolyl group, 3-phenan tolyl group, 4-phenan tolyl group, 9-phenan tolyl group, 1-naphtha SENIRU machine, 2-naphtha SENIRU machine, 9-naphtha SENIRU machine, 4-styryl phenyl group, 1-pyrenyl machine, 2-pyrenyl machine, 4-pyrenyl machine, 2-

[Embodiments of the Invention] Hereafter, this invention is explained in detail. The compound in

biphenylyl machine, 3-biphenylyl machine, 4-biphenylyl machine, a p-terphenyl-4-IRU machine, A p-terphenyl-3-IRU machine, a p-terphenyl-2-IRU machine, an m-terphenyl-4-IRU machine, An m-terphenyl-3-IRU machine, an m-terphenyl-2-IRU machine, o-tolyl group, m-tolyl group, p-tolyl group, a p-t-butylphenyl group, p-(2-phenylpropyl) phenyl group, A 3-methyl-2-naphthyl group, a 4-methyl-1-naphthyl group, a 4-methyl-1-anthryl machine, A 4'-methyl biphenylyl machine, 4" - tbutyl-p-terphenyl-4-IRU machine, 2-pyrrolyl machine, 3-pyrrolyl machine, a pyrazinyl machine, 2pyridinyl group, 3-pyridinyl group, 4-pyridinyl group, 2-indolyl machine, 3-indolyl machine, 4indolyl machine, 5-indolyl machine, 6-indolyl machine, 7-indolyl machine, A 1-iso indolyl machine, a 3-iso indolyl machine, a 4-iso indolyl machine, A 5-iso indolyl machine, a 6-iso indolyl machine, a 7-iso indolyl machine, 2-furil machine, 3-furil machine, a 2-benzofuranyl machine, a 3benzofuranyl machine, A 4-benzofuranyl machine, a 5-benzofuranyl machine, a 6-benzofuranyl machine, A 7-benzofuranyl machine, a 1-iso benzofuranyl machine, a 3-iso benzofuranyl machine, A 4-iso benzofuranyl machine, a 5-iso benzofuranyl machine, a 6-iso benzofuranyl machine, A 7iso benzofuranyl machine, 2-quinolyl machine, 3-quinolyl machine, 4-quinolyl machine, 5quinolyl machine, 6-quinolyl machine, 7-quinolyl machine, 8-quinolyl machine, A 1-iso quinolyl machine, a 3-iso quinolyl machine, a 4-iso quinolyl machine, a 5-iso quinolyl machine, A 6-iso quinolyl machine, a 7-iso quinolyl machine, a 8-iso quinolyl machine, 2-kino KISARINIRU machine, 5-kino KISARINIRU machine, 6-kino KISARINIRU machine, 1-carbazolyl machine, 2carbazolyl machine, 3-carbazolyl machine, 4-carbazolyl machine, 1-phenanthridinyl machine, 2phenanthridinyl machine, 3-phenanthridinyl machine, 4-phenanthridinyl machine, 6phenanthridinyl machine, 7-phenanthridinyl machine, 8-phenanthridinyl machine, 9phenanthridinyl machine, 10-phenanthridinyl machine, 1-acridinyl machine, 2-acridinyl machine, 3-acridinyl machine, 4-acridinyl machine, 9-acridinyl machine, 1, a 7-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-8-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-9-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-7-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-9-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-7-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-8-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, 10-phenan SURORIN -2 - IRU Machine, 1, 10-Phenan SURORIN-3-IRU Machine, 1, 10-Phenan SURORIN-4-IRU Machine, 1, a 10-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-7-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-8-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-10-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-7-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-9-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-10-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-8-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-9-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1-FENAJINIRU machine, 2-FENAJINIRU machine, 1-phenothiazinyl group, 2-phenothiazinyl group, 3phenothiazinyl group, 4-phenothiazinyl group, 1-phenoxazinyl machine, 2-phenoxazinyl machine, 3-phenoxazinyl machine, 4-phenoxazinyl machine, 2-oxazolyl machine, 4-oxazolyl machine, 5oxazolyl machine, 2-oxadiazolyl machine, 5-oxadiazolyl machine, 3-furazanyl group, 2-thienyl group, 3-thienyl group, A 2-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 2-methyl pyrrole-3-IRU machine, A 2-methyl pyrrole-4-IRU machine, a 2-methyl pyrrole-5-IRU machine, A 3-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 3-methyl pyrrole-2-IRU machine, A 3-methyl pyrrole-4-IRU machine, a 3-methyl

pyrrole-5-IRU machine, A 2-t-butyl pyrrole-4-IRU machine, a 3-(2-phenylpropyl) pyrrole-1-IRU machine, A 2-methyl-1-indolyl machine, a 4-methyl-1-indolyl machine, a 2-methyl-3-indolyl machine, A 4-methyl-3-indolyl machine, a 2-t-butyl 1-indolyl machine, a 4-t-butyl 1-indolyl machine, a 2-t-butyl 3-indolyl machine, a 4-t-butyl 3-indolyl machine, etc. are mentioned. [0023] As an alkyl group which is not replaced [substitution or], a methyl group, an ethyl group, a propyl group, An isopropyl machine, n-butyl, s-butyl, an isobutyl machine, t-butyl, n-pentyl machine, n-hexyl machine, n-heptyl machine, n-octyl machine, A hydroxymethyl group, 1hydroxyethyl machine, 2-hydroxyethyl machine, A 2-hydroxy isobutyl machine, 1, 2dihydroxyethyl machine, 1, 3-dihydroxy isopropyl machine, 2, a 3-dihydroxy-t-butyl, 1 and 2, 3trihydroxy propyl group, A chloro methyl group, 1-chloro ethyl group, 2-chloro ethyl group, 2chloro isobutyl machine, 1, 2-dichloro ethyl group, 1, 3-dichloro isopropyl machine, 2, a 3dichloro-t-butyl, 1, 2, 3-TORIKURORO propyl group, a bromomethyl machine, 1-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO isobutyl machine, 1, 2-dibromo ethyl group, 1, 3-dibromo isopropyl machine, 2, a 3-dibromo t-butyl, 1, 2, 3-TORIBUROMO propyl group, an iodine methyl group, 1-iodine ethyl group, 2-iodine ethyl group, 2-iodine isobutyl machine, 1, 2diiodo ethyl group, 1, 3-diiodo isopropyl machine, 2, a 3-diiodo t-butyl, 1, 2, 3-triiodo propyl group, an aminomethyl machine, 1-aminoethyl machine, 2-aminoethyl machine, a 2-amino isobutyl machine, 1, 2-diamino ethyl group, 1, 3-diamino isopropyl machine, 2, a 3-diamino tbutyl, 1, 2, 3-triamino propyl group, a cyano methyl group, 1-cyano ethyl group, 2-cyano ethyl group, 2-cyano isobutyl machine, 1, 2-dicyano ethyl group, 1, 3-dicyano isopropyl machine, 2, a 3dicyano t-butyl, 1, 2, 3-tricyanopropyl machine, a nitro methyl group, 1-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine isobutyl machine, 1, 2-dinitro ethyl group, 1, 3dinitro isopropyl machine, 2, a 3-dinitro t-butyl, 1 and 2, a 3-trinitro propyl group, etc. are mentioned.

[0024] As an ARUKENIRU machine which is not replaced [substitution or] A vinyl group, an allyl group, 1-butenyl group, 2-butenyl group, 3-butenyl group, 1, 3-butane dienyl machine, 1methyl vinyl-group, styryl machine, 2, and 2-diphenyl vinyl group, 1, 2-diphenyl vinyl-group, 1methyl allyl group, 1, and 1-dimethyl allyl group, 2-methyl allyl group, 1-phenyl allyl group, 2phenyl allyl group, 3-phenyl allyl group, 3, and 3-diphenyl allyl group, 1, 2-dimethyl allyl group, a 1-phenyl-1-butenyl group, a 3-phenyl-1-butenyl group, etc. are mentioned. [0025] As a cycloalkyl machine which is not replaced [substitution or], a cyclo propyl group, a cyclo butyl, a cyclopentylic group, a cyclohexyl machine, 4-methyl cyclohexyl machine, etc. are mentioned. The alkoxy group which is not replaced [substitution or] is a basis expressed with -OY. as Y A methyl group, an ethyl group, a propyl group, an isopropyl machine, n-butyl, s-butyl, an isobutyl machine, t-butyl, n-pentyl machine, n-hexyl machine, n-heptyl machine, n-octyl machine, a hydroxymethyl group, 1-hydroxyethyl machine, 2-hydroxyethyl machine, a 2-hydroxy isobutyl machine, 1, 2-dihydroxyethyl machine, 1, 3-dihydroxy isopropyl machine, 2, a 3dihydroxy-t-butyl, 1, 2, 3-trihydroxy propyl group, a chloro methyl group, 1-chloro ethyl group, 2chloro ethyl group, 2-chloro isobutyl machine, 1, 2-dichloro ethyl group, 1, 3-dichloro isopropyl machine, 2, a 3-dichloro-t-butyl, 1, 2, 3-TORIKURORO propyl group, a bromomethyl machine, 1-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO ethyl group, 2-BUROMO isobutyl machine, 1, 2-dibromo ethyl group, 1, 3-dibromo isopropyl machine, 2, a 3-dibromo t-butyl, 1, 2, 3-TORIBUROMO propyl group, an iodine methyl group, 1-iodine ethyl group, 2-iodine ethyl group, 2-iodine isobutyl machine, 1, 2-diiodo ethyl group, 1, 3-diiodo isopropyl machine, 2, a 3-diiodo t-butyl, 1, 2, 3triiodo propyl group, an aminomethyl machine, 1-aminoethyl machine, 2-aminoethyl machine, a 2amino isobutyl machine, 1, 2-diamino ethyl group, 1, 3-diamino isopropyl machine, 2, a 3-diamino t-butyl, 1, 2, 3-triamino propyl group, a cyano methyl group, 1-cyano ethyl group, 2-cyano ethyl group, 2-cyano isobutyl machine, 1, 2-dicyano ethyl group, 1, 3-dicyano isopropyl machine, 2, a 3dicyano t-butyl, 1, 2, 3-tricyanopropyl machine, a nitro methyl group, 1-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine ethyl group, 2-nitroglycerine isobutyl machine, 1, 2-dinitro ethyl group, 1, 3dinitro isopropyl machine, 2, a 3-dinitro t-butyl, 1 and 2, a 3-trinitro propyl group, etc. are mentioned.

[0026] As an example of the aromatic-hydrocarbon machine which is not replaced [substitution

or] A phenyl group, 1-naphthyl group, 2-naphthyl group, 1-anthryl machine, 2-anthryl machine, 9-anthryl machine, 1-phenan tolyl group, 2-phenan tolyl group, 3-phenan tolyl group, 4-phenan tolyl group, 9-phenan tolyl group, 1-naphtha SENIRU machine, 2-naphtha SENIRU machine, 9-naphtha SENIRU machine, 1-pyrenyl machine, 2-pyrenyl machine, 4-pyrenyl machine, 2-biphenylyl machine, 3-biphenylyl machine, 4-biphenylyl machine, a p-terphenyl-4-IRU machine, a p-terphenyl-3-IRU machine, A p-terphenyl-2-IRU machine, an m-terphenyl-4-IRU machine, an m-terphenyl-3-IRU machine, An m-terphenyl-2-IRU machine, o-tolyl group, m-tolyl group, p-tolyl group, A p-t-butylphenyl group, p-(2-phenylpropyl) phenyl group, A 3-methyl-2-naphthyl group, a 4-methyl-1-anthryl machine, a 4'-methyl biphenylyl machine, 4" - A t-butyl-p-terphenyl-4-IRU machine etc. is mentioned.

[0027] As an aromatic heterocycle machine which is not replaced [substitution or], moreover, 1pyrrolyl machine, 2-pyrrolyl machine, 3-pyrrolyl machine, a pyrazinyl machine, 2-pyridinyl group, 3-pyridinyl group, 4-pyridinyl group, 1-indolyl machine, 2-indolyl machine, 3-indolyl machine, 4indolyl machine, 5-indolyl machine, 6-indolyl machine, 7-indolyl machine, a 1-iso indolyl machine, a 2-iso indolyl machine, A 3-iso indolyl machine, a 4-iso indolyl machine, a 5-iso indolyl machine, A 6-iso indolyl machine, a 7-iso indolyl machine, 2-furil machine, 3-furil machine, A 2benzofuranyl machine, a 3-benzofuranyl machine, a 4-benzofuranyl machine, A 5-benzofuranyl machine, a 6-benzofuranyl machine, a 7-benzofuranyl machine, A 1-iso benzofuranyl machine, a 3-iso benzofuranyl machine, a 4-iso benzofuranyl machine, A 5-iso benzofuranyl machine, a 6-iso benzofuranyl machine, a 7-iso benzofuranyl machine, 2-quinolyl machine, 3-quinolyl machine, 4quinolyl machine, 5-quinolyl machine, 6-quinolyl machine, 7-quinolyl machine, 8-quinolyl machine, a 1-iso quinolyl machine, A 3-iso quinolyl machine, a 4-iso quinolyl machine, a 5-iso quinolyl machine, a 6-iso quinolyl machine, A 7-iso quinolyl machine, a 8-iso quinolyl machine, 2-kino KISARINIRU machine, 5-kino KISARINIRU machine, 6-kino KISARINIRU machine, 1carbazolyl machine, 2-carbazolyl machine, 3-carbazolyl machine, 4-carbazolyl machine, 9carbazolyl machine, 1-phenanthridinyl machine, 2-phenanthridinyl machine, 3-phenanthridinyl machine, 4-phenanthridinyl machine, 6-phenanthridinyl machine, 7-phenanthridinyl machine, 8phenanthridinyl machine, 9-phenanthridinyl machine, 10-phenanthridinyl machine, 1-acridinyl machine, 2-acridinyl machine, 3-acridinyl machine, 4-acridinyl machine, 9-acridinyl machine, 1, a 7-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-8-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-9-IRU machine, 1, a 7-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 8phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-7-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-9-IRU machine, 1, a 8-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-5-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-6-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-7-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-8-IRU machine, 1, a 9-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1, a 10-phenan SURORIN-2-IRU machine, 1, a 10-phenan SURORIN-3-IRU machine, 1, a 10-phenan SURORIN-4-IRU machine, 1, a 10-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 9phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-7-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-8-IRU machine, 2, a 9-phenan SURORIN-10-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-7-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-9-IRU machine, 2, a 8-phenan SURORIN-10-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-1-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-3-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-4-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-5-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-6-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-8-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-9-IRU machine, 2, a 7-phenan SURORIN-10-IRU machine, 1-FENAJINIRU machine, 2-FENAJINIRU machine, 1-phenothiazinyl group, 2phenothiazinyl group, 3-phenothiazinyl group, 4-phenothiazinyl group, 10-phenothiazinyl group, 1-phenoxazinyl machine, 2-phenoxazinyl machine, 3-phenoxazinyl machine, 4-phenoxazinyl machine, 10-phenoxazinyl machine, 2-oxazolyl machine, 4-oxazolyl machine, 5-oxazolyl machine, 2-oxadiazolyl machine, 3-furazanyl group, 2-thienyl group, 3-thienyl group, A 2-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 2-methyl pyrrole-3-IRU machine, A 2-methyl pyrrole-4-IRU machine, a 3-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 3-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 3-methyl pyrrole-5-IRU machine, a 3-methyl pyrrole-1-IRU machine, a 2-methyl-1-indolyl pyrrole-1-IRU machine, A 2-methyl-1-indolyl machine, a 4-methyl-1-indolyl machine, a 2-methyl-3-indolyl machine, a 2-t-butyl 1-indolyl machine, a 2-t-butyl 3-indolyl machine, a 4-t-butyl 3-indolyl machine, etc. are mentioned.

[0028] As an aralkyl machine which is not replaced [substitution or] A benzyl, 1-phenylethyl machine, 2-phenylethyl machine, 1-phenyl isopropyl machine, 2-phenyl isopropyl machine, a phenyl-t-butyl, alpha-naphthyl methyl group, A 1-alpha-naphthyl ethyl group, a 2-alpha-naphthyl ethyl group, a 1-alpha-naphthyl isopropyl machine, A 2-alpha-naphthyl isopropyl machine, beta-naphthyl methyl group, a 1-beta-naphthyl ethyl group, A 2-beta-naphthyl ethyl group, a 1-beta-naphthyl isopropyl machine, 1-pyrrolyl methyl group, 2-(1-pyrrolyl) ethyl group, p-methyl benzyl, m-methyl benzyl, o-methyl benzyl, p-chloro benzyl, m-chloro benzyl, and p-BUROMO benzyl, m-BUROMO benzyl, o-BUROMO benzyl, and p-iodine benzyl, m-iodine benzyl, o-iodine benzyl, a p-hydroxy benzyl, An m-hydroxy benzyl, an o-hydroxy benzyl, and a p-amino benzyl, An m-amino benzyl, an o-amino benzyl, and p-nitrobenzyl machine, m-nitrobenzyl machine, o-nitrobenzyl machine, p-cyano benzyl, m-cyano benzyl, o-cyano benzyl, a 1-hydroxy-2-phenyl isopropyl machine, a 1-chloro-2-phenyl isopropyl machine, etc. are mentioned.

[0029] The aryloxy group which is not replaced [substitution or] is expressed as -OZ. as Z A phenyl group, 1-naphthyl group, 2-naphthyl group, 1-anthryl machine, 2-anthryl machine, 9-anthryl machine, 1-phenan tolyl group, 2-phenan tolyl group, 3-phenan tolyl group, 4-phenan tolyl group, 9-phenan tolyl group, 1-naphtha SENIRU machine, 2-naphtha SENIRU machine, 9-naphtha SENIRU machine, 1-pyrenyl machine, 2-pyrenyl machine, 4-pyrenyl machine, 2-biphenylyl machine, 3-biphenylyl machine, 4-biphenylyl machine, a p-terphenyl-4-IRU machine, a p-terphenyl-3-IRU machine, A p-terphenyl-2-IRU machine, an m-terphenyl-4-IRU machine, an m-terphenyl-3-IRU machine,

Since it became timeout time, translation result display processing is stopped.

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000 — 208262

(P2000-208262A) (43)公開日 平成12年7月28日(2000.7.28)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	•	FI	• • •		テーマコート・	· (参考)
H05B 33/14			H05B 33/14		· B	3K007	
C09K 11/06	660		C09K 11/06	660			,
H05B 33/22		•	H05B 33/22	· .	В		
			•	•	D		
	·			<i>i</i> 1			•

審査請求 有 請求項の数4 OL (全16頁)

(21)出顯番号	特願平11-7051	(71)出願人	000004237
			日本電気株式会社
(22)出願日	平成11年1月13日(1999.1.13)		東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者	東口 達
			東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
			式会社内
		(72)発明者	石川 仁志
			東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
•			式会社内
		(74)代理人	100102864
	•		弁理士 工藤 実 (外1名)

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

【課題】 高輝度な有機EL素子を提供する。

有機EL素子の構成材料として、下記一 【解決手段】 般式[化1] (化学式中、Mはn価の金属イオンを表 す。nは1、2、3のいずれか。 $R' \sim R'$ はそれぞれ 独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換 若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換 若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のア ルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、 置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置 換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複 素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若し くは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換の アルコキシカルポニル基、カルポキシル基を表す。また R¹~R¹は、それらのうちの2つで環を形成していて も良い。) で表される特定のピロメテン金属錯体化合物 を用いる。


【化1】



【特許請求の範囲】

陰極と陽極の間に発光層を含む一層また 【請求項1】 は複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッ センス素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層 に、一般式[化1]:

【化1】



(化学式中、Mはn価の金属イオンを表す。R'~R' はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ ル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シア ノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは 無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロア 20 ルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若 しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換: の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル 基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若し くは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基 を表す。またR¹~R¹は、それらのうちの2つで環を 形成していても良い。 n は 1、 2、 3 のいずれか。) で 示されるピロメテン金属錯体化合物を単独もしくは混合 物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセン ス素子。

【請求項2】 前記有機薄膜層は、前記発光層を有し、 前記発光層に、前記一般式[化1]で表される化合物を 単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請求項 1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 前記有機薄膜層は、正孔輸送材料を含む. 正孔輸送層を有し、

前記正孔輸送層に、前記一般式[化1]で表される化合 物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする諸 求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

電子輸送層を有し、

前記電子輸送層に、前記一般式[化1]で表される化合 物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする請 求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発光特性に優れた 有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス(EL) 50 る。

素子は、電界を印加することにより、陽極より注入され た正孔と陰極より注入された電子の再結合エネルギーに より蛍光性物質が発光する原理を利用した自発光素子で ある。

【0003】イーストマン・コダック社のC. W. Ta ngらによる積層型素子による低電圧駆動有機EL素子 の報告(C. W. Tang, S. A. VanSlyk e, アプライドフィジックスレターズ (Applied Physics Letters), 51巻, 913 10 頁、1987年 など)がなされて以来、有機材料を構 成材料とする有機EL素子に関する研究が盛んに行われ ている。

【0004】Tangらは、トリス(8-ヒドロキシキ ノリノールアルミニウム)を発光層に、トリフェニルジ アミン誘導体を正孔輸送層に用いている。積層構造の利 点としては、発光層への正孔の注入効率を高めること、 陰極より注入された電子をブロックして再結合により生 成する励起子の生成効率を高めること、発光層内で生成 した励起子を閉じこめることなどが挙げられる。

【0005】この例のように有機EL素子の素子構造と しては、正孔輸送(注入)層、電子輸送性発光層の2層 型、または正孔輸送(注入)層、発光層、電子輸送(注 入)層の3層型等が良く知られている。

【0006】こうした積層型構造素子では注入された正 孔と電子の再結合効率を髙めるため、素子構造や形成方 法の工夫がなされている。

【0007】正孔輸送性材料としてはスターパースト分 子である4,4',4"-トリス(3-メチルフェニル フェニルアミノ) トリフェニルアミンやN, N′ージフ 30 エニルーN, N'ーピス(3-メチルフェニル)-

[1, 1'-ピフェニル] -4, 4'-ジアミン等のト リフェニルアミン誘導体や芳香族ジアミン誘導体が良く 知られている(例えば、特開平8-20771号公報、 特開平8-40995号公報、特開平8-40997号 公報、公報特開平8-543397号公報、特開平8-87122号公報等)。

【0008】電子輸送性材料としてはオキサジアゾール 誘導体、トリアゾール誘導体等が良く知られている。

【0009】また、発光材料としてはトリス(8-キノ 【請求項4】 前記有機薄膜層は、電子輸送材料を含む 40 リノラート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマ リン誘導体、テトラフェニルプタジエン誘導体、ビスス チリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の 発光材料が知られており、それらの発光色も青色から赤 色までの可視領域の発光が得られることが報告されてお り、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、 特開平8-239655号公報、特開平7-13856 1号公報、特開平3-200289号公報等)。

> 【0010】また、特開平9-289081号公報に、 発光材料としてピロメテン-BF2 錯体が開示されてい

[0011]

【発明が解決しようとする課題】最近では高輝度、長寿命の有機EL素子が開示あるいは報告されているが、まだ必ずしも充分なものとはいえない。従って、高性能を示す材料開発が強く求められている。本発明の目的は、高輝度の有機EL素子を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決するために鋭意検討した結果、特定のピロメテン金属錯体化合物を発光材料として用いて作製した有機E 10 L素子は従来よりも高輝度発光することを見いだした。【0013】また、前記材料は高いキャリヤ輸送性を有することがわかり、前記材料を正孔輸送材料あるいは電子輸送材料として作製した有機EL素子、及び前記材料と他の正孔輸送材料あるいは電子輸送材料との混合薄膜

【0014】すなわち本発明は、陰極と陽極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセント素子において、前記有機薄膜層の少なくとも一層に、一般式[化2]:

を用いて作製した有機EL素子は従来よりも高輝度発光

を示すことを見いだし本発明に至った。

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
R^3 & R^2 \\
R^4 & N \\
R^5 & N \\
R^6 & R^7
\end{array}$$

(式中、Mはn価の金属イオンを表す。nは1、2、3のいずれか。R¹~R²はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルカニル基、置換若しくは無置換のアルカニシ基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリー40ルオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹~R²は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)で示されるピロメテン金属錯体化合物を単独もしくは混合物で含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0015】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも発光層を有し、この発光層が一般式 [化2] で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0016】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも正孔輸送層を有し、この発光層が一般式 [化2]で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

【0017】また、本発明は前記有機薄膜層として少なくとも電子輸送層を有し、この発光層が一般式 [化2]で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子である。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に関わる化合物は、一般式 [化2]で表される構造を有する化合物である。(式中、Mはn価の金属イオンを表す。nは1,2,3のいずれかからなる。R'~R'はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR'~R'は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。)

【0019】n価の金属イオンを示すMに用いることのできる金属としては、アルミニウム、ベリリウム、ピスマス、カドミウム、セリウム、コバルト、銅、鉄、ガリのム、ゲルマニウム、水銀、インジウム、ランタン、マグネシウム、モリブデン、ニオブ、アンチモン、スカンジウム、スズ、タンタル、トリウム、チタニウム、ウラン、タングステン、ジルコニウム、パナジウム、亜鉛、銀、金、白金、クロム、マンガン、イットリウム、ニッケル、パラジウム、鉛、セレン、テルル、タリウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ネオジウム、ユーロピウム、エルビウムが挙げられるがこれらに限られるものではない。

【0020】R¹~R²はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のデ香族複素環基、置換若しくは無置換のデラルキル基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。またR¹~R²は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。

【0021】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭

素、ヨウ素が挙げられる。

【0022】 置換若しくは無置換のアミノ基は-NX¹ X² と表され、 X¹ 、 X² としてはそれぞれ独立に、 水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ ピル基、n-プチル基、s-プチル基、イソプチル基、 tープチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nー ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1 -ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソプチル基、1、2-ジヒドロキシエチル 基、1、3-ジヒドロキシイソプロピル基、2、3-ジ 10 ヒドロキシーt-ブチル基、1、2、3-トリヒドロキ シプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、 2-クロロエチル基、2-クロロイソプチル基、1,2 - ジクロロエチル基、1、3 - ジクロロイソプロピル 基、2、3-ジクロローt-ブチル基、1,2,3-ト リクロロプロピル基、プロモメチル基、1-プロモエチ ル基、2-プロモエチル基、2-プロモイソブチル基、 1. 2-ジプロモエチル基、1. 3-ジプロモイソプロ ピル基、2,3-ジプロモt-プチル基、1,2,3-トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエ 20 チル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソプチル 基、1、2-ジョードエチル基、1、3-ジョードイソ プロピル基、2,3-ジョードt-ブチル基、1,2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミ 「ノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチ ル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイ ソプロピル基、2、3-ジアミノt-ブチル基、1, 2、3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソ ブチル基、1.2-ジシアノエチル基、1.3-ジシア 30 ノイソプロピル基、2、3-ジシアノt-プチル基、 1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、 1-二トロエチル基、2-二トロエチル基、2-二トロ イソプチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジ ニトロイソプロピル基、2,3-ジニトロt-ブチル 基、1,2,3-トリニトロプロピル基、フェニル基、 1-ナフチル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、 2-アントリル基、9-アントリル基、1-フェナント リル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル 基、4-フェナントリル基、9-フェナントリル基、1 40 リン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イ -ナフタセニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセ ニル基、4-スチリルフェニル基、1-ピレニル基、2 - ピレニル基、4 - ピレニル基、2 - ピフェニルイル 基、3-ピフェニルイル基、4-ピフェニルイル基、p -ターフェニル-4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェ ニルー4-イル基、m-ターフェニルー3-イル基、m ーターフェニルー2ーイル基、o-トリル基、m-トリ ル基、p-トリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチルー2- 50 リンー10-イル基、1,10-フェナンスロリンー2

ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル -1-アントリル基、4'-メチルピフェニルイル基、 4' '-t-プチル-p-ターフェニル-4-イル基、 2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、 2-インドリル基、3-インドリル基、4-インドリル 基、5-インドリル基、6-インドリル基、7-インド リル基、1-イソインドリル基、3-イソインドリル 基、4-イソインドリル基、5-イソインドリル基、6 ーイソインドリル基、7ーイソインドリル基、2ーフリ ル基、3-フリル基、2-ペンゾフラニル基、3-ペン ゾフラニル基、4-ペンゾフラニル基、5-ペンゾフラ ニル基、6-ペンソフラニル基、7-ペンソフラニル 基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニ ル基、4-イソベンソフラニル基、5-イソベンソフラ ニル基、6-イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフ ラニル基、2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノ リル基、5-キノリル基、6-キノリル基、7-キノリ ル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソ キノリル基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル 基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イ ソキノリル基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリ ニル基、6-キノキサリニル基、1-カルパゾリル基、 2-カルパゾリル基、3-カルパゾリル基、4-カルパ ゾリル基、1-フェナンスリジニル基、2-フェナンス リジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナン スリジニル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナ ンスリジニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェ ナンスリジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニ ル基、4-アクリジニル基、9-アクリジニル基、1、 **7ーフェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナン** スロリン-3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4 ーイル基、1,7ーフェナンスロリン-5ーイル基、 1, 7-フェナンスロリン-6-イル基、1, 7-フェ ナンスロリン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン - 9 - イル基、1、7 - フェナンスロリン- 10 - イル 基、1,8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロ ル基、1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8 ーフェナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンス ロリン-9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10 - イル基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、 1, 9-フェナンスロリン-3-イル基、1, 9-フェ ナンスロリン-4-イル基、1,9-フェナンスロリン -5-イル基、1、9-フェナンスロリン-6-イル 基、1,9-フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロ

- イル基、1,10-フェナンスロリン-3-イル基、 1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロ リン-1-イル基、2、9-フェナンスロリン-3-イ ル基、2,9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9 -フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンス ロリン-6-イル基、2、9-フェナンスロリン-7-イル基、2、9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナ ンスロリン-1-イル基、2、8-フェナンスロリン- 10 3-イル基、2、8-フェナンスロリン-4-イル基、 2,8-フェナンスロリン-5-イル基、2,8-フェ ナンスロリンー6-イル基、2,8-フェナンスロリン - 7 - イル基、2、8 - フェナンスロリン-9 - イル 基、2,8-フェナンスロリン-10-イル基、2,7 -フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンス ロリンー3ーイル基、2、7ーフェナンスロリンー4ー イル基、2、7-フェナンスロリン-5-イル基、2、 **7-フェナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナン** スロリン-8-イル基、2,7-フェナンスロリン-9 20 ノイソプロピル基、2,3-ジシアノtープチル基、 -イル基、2, 7-フェナンスロリン-10-イル基、 1-フェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノ チアジニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチ アジニル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサ ジニル基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジ ニル基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル 基、4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オ キサジアソリル基、5-オキサジアソリル基、3-フラ ザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチ ルピロールー1-イル基、2-メチルピロール-3-イ 30 -メチルビニル基、スチリル基、2,2-ジフェニルビ ル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピ ロールー5-イル基、3-メチルピロールー1-イル 基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロ ールー4-イル基、3-メチルピロールー5-イル基、 2-t-ブチルピロール-4-イル基、3-(2-フェ ニルプロピル) ピロールー1-イル基、2-メチルー1 -インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メチル-3-インドリ ル基、2-t-プチル1-インドリル基、4-t-プチ ル1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル 基、4-t-プチル3-インドリル基等が挙げられる。 【0023】置換若しくは無置換のアルキル基として は、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル 基、n-プチル基、s-プチル基、イソプチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプ チル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒ ドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒド ロキシイソプチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、 1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒド ロキシーt-ブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプ 50

ロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジ クロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、 2, 3-ジクロローt-プチル基、1, 2, 3-トリク ロロプロピル基、プロモメチル基、1-プロモエチル 基、2-プロモエチル基、2-プロモイソプチル基、 1,2-ジプロモエチル基、1,3-ジプロモイソプロ ピル基、2、3-ジプロモt-プチル基、1、2、3-トリプロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエ チル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソプチル 基、1、2-ジョードエチル基、1、3-ジョードイソ プロピル基、2,3-ジョードt-ブチル基、1,2, 3-トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミ ノエチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソプチ ル基、1、2-ジアミノエチル基、1、3-ジアミノイ ソプロピル基、2、3-ジアミノt-プチル基、1、 2, 3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソ プチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシア 1,2,3-トリシアノプロピル基、ニトロメチル基、 1-ニトロエチル基、2-ニトロエチル基、2-ニトロ イソプチル基、1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジ ニトロイソプロピル基、2、3-ジニトロt-ブチル 基、1,2,3-トリニトロプロピル基等が挙げられ る。

【0024】置換若しくは無置換のアルケニル基として は、ビニル基、アリル基、1-プテニル基、2-プテニ ル基、3-プテニル基、1,3-プタンジエニル基、1 ニル基、1,2ージフェニルピニル基、1ーメチルアリ ル基、1、1-ジメチルアリル基、2-メチルアリル 基、1-フェニルアリル基、2-フェニルアリル基、3 -フェニルアリル基、3、3-ジフェニルアリル基、 1, 2-ジメチルアリル基、1-フェニル-1-プテニ ル基、3-フェニル-1-プテニル基等が挙げられる。 【0025】置換若しくは無置換のシクロアルキル基と しては、シクロプロピル基、シクロプチル基、シクロペ ンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシ 40 ル基等が挙げられる。置換若しくは無置換のアルコキシ 基は、-OYで表される基であり、Yとしては、メチル 基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プチ ル基、sープチル基、イソプチル基、tープチル基、n -ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチ ル基、2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブ チル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒ ドロキシイソプロピル基、2, 3-ジヒドロキシーt-プチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、ク ロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル

基、2-クロロイソプチル基、1,2-ジクロロエチル 基、1、3-ジクロロイソプロピル基、2、3-ジクロ ローtープチル基、1,2,3-トリクロロプロピル 基、プロモメチル基、1-プロモエチル基、2-プロモ エチル基、2-プロモイソプチル基、1,2-ジプロモ エチル基、1,3-ジプロモイソプロピル基、2,3-ジプロモt-プチル基、1,2,3-トリプロモプロピ ル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨー ドエチル基、2-ヨードイソプチル基、1,2-ジョー ドエチル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3 10 ージョード t ープチル基、1,2,3ートリヨードプロ ピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソプチル基、1、2-ジア ミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノ t ープチル基、1,2,3ートリアミノプ ロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シアノエチル基、2-シアノイソプチル基、1、2-ジ シアノエチル基、1、3-ジシアノイソプロピル基、 2, 3-ジシアノtープチル基、1, 2, 3-トリシア ノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、 2-二トロエチル基、2-二トロイソプチル基、1,2 ージニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル 基、2、3-ジニトロt-ブチル基、1、2、3-トリ ニトロプロピル基等が挙げられる。

【0026】置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基の 例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチ ル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アン トリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル 基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9 -フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタ 30 セニル基、9-ナフタセニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ピフェニルイル基、 3-ビフェニルイル基、4-ビフェニルイル基、p-タ ーフェニルー4-イル基、p-ターフェニルー3-イル 基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニル -4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-タ ーフェニルー2ーイル基、oートリル基、mートリル 基、pートリル基、p-t-プチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチルー2-ナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル 40 基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9--1-アントリル基、4'-メチルピフェニルイル基、 4"-t-プチル-p-ターフェニル-4-イル基等が 挙げられる。

【0027】また、置換若しくは無置換の芳香族複素環 基としては1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロ リル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジ ニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-イ ンドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5 ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリル 基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3 50 -イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、

ーイソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソ インドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ペンゾフラ ニル基、3-ペンソフラニル基、4-ペンソフラニル 基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7 ーベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5 ーイソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラニル基、 7-イソペンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノ リル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリ ル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノ リル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5 ーイソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノ リル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、 5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カ ルパゾリル基、2-カルパゾリル基、3-カルパゾリル 基、4-カルパソリル基、9-カルパソリル基、1-フ ェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニル基、6 20 - - フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジニル基、 8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリジニル 基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジニル 基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4-ア クリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェナン スロリン-2-イル基、1、7-フェナンスロリン-3 ーイル基、1,7ーフェナンスロリン-4ーイル基、 1, 7-フェナンスロリン-5-イル基、1, 7-フェ ナンスロリンー6-イル基、1,7-フェナンスロリン -8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イル 基、1、7-フェナンスロリン-10-イル基、1、8 ーフェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナンス ロリン-3-イル基、1、8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、1, 8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フェナン スロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン-9 - イル基、1, 8-フェナンスロリン-10-イル基、 1. 9-フェナンスロリン-2-イル基、1, 9-フェ ナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロリン - 4 - イル基、1, 9 - フェナンスロリン-5 - イル フェナンスロリンー?-イル基、1,9-フェナンスロ リン-8-イル基、1、9-フェナンスロリン-10-イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、 1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4-イル基、1,10-フェナンス ロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナン スロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6

11 2, 9-フェナンスロリン-8-イル基、2, 9-フェ ナンスロリン-10-イル基、2、8-フェナンスロリ ン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル 基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリンー5ーイル基、2、8ーフェナンスロ リンー6-イル基、2、8-フェナンスロリン-7-イ ル基、2、8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8 -フェナンスロリン-10-イル基、2、7-フェナン スロリン-1-イル基、2、7-フェナンスロリン-3 -イル基、2,7ーフェナンスロリンー4ーイル基、 2. 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェ ナンスロリン-6-イル基、2、7-フェナンスロリン -8-イル基、2、7-フェナンスロリン-9-イル 基、2、7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フ ェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジ ニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニ ル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニ ル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル 基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、 4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサ ジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニ ル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピ ロールー1-イル基、2-メチルピロールー3-イル 基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロ ール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、 3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール -4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2tープチルピロールー4-イル基、3-(2-フェニル プロピル) ピロールー1ーイル基、2-メチルー1ーイ 30 ルメチル基、1-α-ナフチルエチル基、2-α-ナフ 40

ンドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチ ルー3ーインドリル基、4-メチルー3ーインドリル 基、2-t-プチル1-インドリル基、4-t-プチル 1-インドリル基、2-t-プチル3-インドリル基、 4-t-ブチル3-インドリル基、等が挙げられる。 【0028】置換若しくは無置換のアラルキル基として は、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニル エチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニル イソプロピル基、フェニルー t - ブチル基、 α - ナフチ チルエチル基、1-α-ナフチルイソプロピル基、2- α ーナフチルイソプロピル基、 β ーナフチルメチル基、 1-β-ナフチルエチル基、2-β-ナフチルエチル 基、1-β-ナフチルイソプロピル基、2-β-ナフチ ルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル) エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチ ルベンジル基、o-メチルベンジル基、p-クロロベン 「ジル基、mークロロペンジル基、oークロロペンジル」 基、 p-プロモベンジル基、m-プロモベンジル基、 oープロモベンジル基、 pーヨードベンジル基、mー

ヨードペンジル基、o-ヨードペンジル基、p-ヒドロ キシベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒド ロキシペンジル基、 p-アミノペンジル基、m-アミ ノベンジル基、o-アミノベンジル基、 p-二トロベ ンジル基、mーニトロペンジル基、oーニトロペンジル 基、 pーシアノベンジル基、mーシアノベンジル基、 0-シアノペンジル基、1-ヒドロキシ-2-フェニル イソプロピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピ ル基等が挙げられる。

12

【0029】置換若しくは無置換のアリールオキシ基 は、一〇乙と表され、乙としてはフェニル基、1ーナフ チル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アン トリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、 2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フ ェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセ ニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1 - ピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ピフェニルイル基、3-ピフェニルイル基、4-ピフェ ニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ター 20 フェニルー3-イル基、p-ターフェニルー2-イル 基、m-ターフェニルー4-イル基、m-ターフェニル - 3 - イル基、m - ターフェニル - 2 - イル基、o - ト リル基、mートリル基、pートリル基、pーtープチル フェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル 基、3-メチルー2-ナフチル基、4-メチルー1-ナフ チル基、4-メチル-1-アントリル基、4'-メチル ビフェニルイル基、4"-t-プチル-p-ターフェニ ルー4-イル基、2-ピロリル基、3-ピロリル基、ピ ラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル基、4 - ピリジニル基、2-インドリル基、3-インドリル 基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-インド リル基、7-インドリル基、1-イソインドリル基、3 ーイソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソ インドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ペンソフラ ニル基、3-ペンゾフラニル基、4-ペンゾフラニル 基、5-ペンゾフラニル基、6-ペンゾフラニル基、7 **ーペンゾフラニル基、1-イソペンゾフラニル基、3-**イソベンプフラニル基、4-イソベンソフラニル基、5 -イソペンゾフラニル基、6-イソペンゾフラニル基、 7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、3-キノ リル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノリ ル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノ リル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、5 ーイソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノ リル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル基、 5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル基、1-カ ルパゾリル基、2-カルパゾリル基、3-カルパゾリル 基、4-カルパゾリル基、1-フェナンスリジニル基、 50 2-フェナンスリジニル基、3-フェナンスリジニル

基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナンスリジニ ル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナンスリジ ニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フェナンス リジニル基、1-アクリジニル基、2-アクリジニル 基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル基、9-ア クリジニル基、1、7-フェナンスロリン-2-イル 基、1、7-フェナンスロリン-3-イル基、1、7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェナンスロ リンー5-イル基、1.7-フェナンスロリン-6-イ **ル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル基、1,7 10** -フェナンスロリン-9-イル基、1、7-フェナンス ロリン-10-イル基、1、8-フェナンスロリン-2 ーイル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、 1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1,8-フェ ナンスロリン-5-イル基、1、8-フェナンスロリン -6-イル基、1、8-フェナンスロリン-7-イル 基、1、8-フェナンスロリン-9-イル基、1、8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フェナンス ロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9ーフェナンスロリン-4ーイル基、1. 9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナン スロリンー6-イル基、1,9-フェナンスロリン-7 ーイル基、1,9-フェナンスロリン-8-イル基、1 1, 9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリンー2-イル基、1.10-フェナンス ロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリン-4 -イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イル基、 2, 9-フェナンスロリン-1-イル基、2, 9-フェ ナンスロリン-3-イル基、2、9-フェナンスロリン -4-イル基、2,9-フェナンスロリン-5-イル 基、2、9-フェナンスロリン-6-イル基、2、9-フェナンスロリンー?-イル基、2、9-フェナンスロ リン-8-イル基、2,9-フェナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、2, 8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェナン スロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン-5 - イル基、2,8-フェナンスロリン-6-イル基、 2,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェ ナンスロリン-9-イル基、2,8-フェナンスロリン -10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル 40 エチル基、2-アミノイソプチル基、1,2-ジアミノ 基、2、7-フェナンスロリン-3-イル基、2、7-フェナンスロリン-4-イル基、2,7-フェナンスロ リン-5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6-イ ル基、2, 7-フェナンスロリン-8-イル基、2, 7 -フェナンスロリン-9-イル基、2,7-フェナンス ロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2-フェ ナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェノチア ジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノチアジ ニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニ

基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、5-オ キサゾリル基、2-オキサジアソリル基、5-オキサジ アゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル基、2-メ チルピロールー3-イル基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、3-メチル ピロールー1ーイル基、3-メチルピロール-2-イル 基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロ ール-5-イル基、2-t-プチルピロール-4-イル 基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール-1-イル 基、2-メチル-1-インドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル-3-インドリル基、4-メ チルー3-インドリル基、2-t-プチル1-インドリ ル基、4-t-プチル1-インドリル基、2-t-プチ ル3-インドリル基、4-t-プチル3-インドリル基 等が挙げられる。

【0030】 置換若しくは無置換のアルコキシカルボニ ル基は、-COOYと表され、Yとしてはメチル基、エ チル基、プロピル基、イソプロピル基、n-プチル基、 20 s - プチル基、イソプチル基、 t - プチル基、 n - ペン チル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチ ル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、 2-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソプチル 基、1、2-ジヒドロキシエチル基、1、3-ジヒドロ キシイソプロピル基、2、3-ジヒドロキシーt-ブチ ル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロ メチル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、 2-クロロイソプチル基、1,2-ジクロロエチル基、 1, 3-ジクロロイソプロピル基、2, 3-ジクロロー 30 tープチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、プ ロモメチル基、1-プロモエチル基、2-プロモエチル 基、2-プロモイソプチル基、1,2-ジプロモエチル 基、1、3-ジプロモイソプロピル基、2、3-ジプロ モ t ープチル基、1, 2, 3 ートリプロモプロピル基、 ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチ - ル基、2-ヨードイソプチル基、1,2-ジヨードエチ ル基、1、3-ジョードイソプロピル基、2、3-ジョ ードt-ブチル基、1,2,3-トリヨードプロピル 基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-アミノ エチル基、1、3-ジアミノイソプロピル基、2、3-ジアミノ t ープチル基、1,2,3ートリアミノプロピ ル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2-シア ノエチル基、2-シアノイソプチル基、1,2-ジシア ノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、2,3 ージシアノ t ープチル基、1,2,3-トリシアノプロ ピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、2-ニ トロエチル基、2-二トロイソプチル基、1,2-ジニ トロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル基、2, ル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 50 3-ジニトロt-プチル基、1,2,3-トリニトロプ

10


ロピル基等が挙げられる。


【0031】また、環を形成する2価基の例としては、 テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン 基、ジフェニルメタン-2, 2'-ジイル基、ジフェニ ルエタン-3, 3'-ジイル基、ジフェニルプロパン-4, 4'-ジイル基、1, 3-ブタジエン-1, 4-ジ イル基等が挙げられる。


【0032】以下の[化3]から[化10]に示される 化学式によって、本発明による化合物の例を挙げるが、 本発明はこれらに限定されるものではない。

【化3】

【化7】 N 2







【0033】本発明における有機EL素子の素子構造は、電極間に有機層を1層あるいは2層以上積層した構造であり、その例が、図1~4に示される。

【0034】図1に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、発光層4、陰極6からなる。

【0035】図2に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、正孔輸送層3、発光層4、電子輸送層5、陰極6からなる。

【0036】図3に示される素子構造は、基板1上に設 50 けられた陽極2、正孔輸送層3、発光層4、陰極6から

なる。

【0037】図4に示される素子構造は、基板1上に設けられた陽極2、発光層4、電子輸送層5、陰極6からなる。ここで、正孔輸送層3、発光層4、電子輸送層5が有機層にあたる。

. 17

【0038】本発明における化合物は上記のどの有機層に用いられてもよく、他の正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料にドープさせることも可能である。

【0039】本発明に用いられる正孔輸送材料は特に限定されず、通常正孔輸送剤として使用されている化合物 10であれば何を使用してもよい。例えば、下記のピス(ジ(p-トリル)アミノフェニル)-1,1-シクロヘキサン[化11]、N,N'ージフェニルーN,N'ーピス(3-メチルフェニル)-1,1'ーピフェニルー4,4'ージアミン[化12]、N,N'ージフェニルーN-N-ピス(1-ナフチル)-1,1'ーピフェニルーN-N-ピス(1-ナフチル)-1,1'ーピフェニルジアミン類や、スターパースト型分子([化14]~[化16]等)等が挙げられる。

【化11】

【化12】

【化13】

【化14】

【化15】

【化16】

20 -

【0040】本発明に用いられる電子輸送材料は特に限定されず、通常電子輸送材として使用されている化合物であれば何を使用してもよい。例えば、下記に示す、2-(4-ピフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール}-m-フェニレン[化18]、等のオキサジアゾール}ーm-フェニレン[化18]、等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体([化19]、[化20]等)、キノリノール系の金属錯体([化21]~[化24]等)が挙げられる。

【化17】

【化18】

40

【化20】

【化21】

【化22]

【化23】

【化24】

【0041】有機薄膜EL素子の陽極2は、正孔を正孔輸送層3又は発光層4に注入する役割を担うものであり、4.5 e V以上の仕事関数を有することが効果的である。本発明に用いられる陽極材料の具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等が適用できる。

【0042】また陰極6としては、電子輸送層5又は発光層4に電子を注入する目的で、仕事関数の小さい材料が好ましい。陰極材料は特に限定されないが、具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウム、マグネシウム・マグネシウムーアルミニウム合金、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムースカンジウムーリチウム合金、マグネシウムー銀合金等が使用できる。

【0043】本発明の有機EL素子の各層の形成方法は特に限定されない。従来公知の真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法を用いることができる。本発明の有機EL素子に用いる、一般式 [化2]で示される化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE法)あるいは溶媒に溶かした溶液のディッピング法、スピンコーティング法、キャスティング法、パーコート法、ロールコート法等の塗布法による公知の方法で形成することができる。

【0044】本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じやすく、逆に厚すぎると高い印加電圧が必要となり効率が悪くなるため、通常は膜厚数nm以上1μm以下の範囲が好ましい。

40 【0045】以下、本発明を実施例をもとに詳細に説明 するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施 例に限定されない。

【0046】(合成例1)5-フェニルー4、6-ジピリンの合成。

ベンゾアルデヒド、ピロールのトルエン溶液にトリフルオロ酢酸を加え3時間還流した。得られた反応液を炭酸ナトリウム水溶液で洗浄後、乾燥した。これを常法に従って精製し5-フェニルジピロメタンを得た。こうして得たジピロメタンをクロロホルム溶液にし、2、3-ジ50 クロロ-5、6-ジシアノ-1、4-キノンを加え、室

温で攪拌した。反応液を濃縮後、カラムクロマトグラフ ィーにて精製し、目的とする5-フェニルー4、6-ジ ピリンを得た。

【0047】(合成例2)5-p-シアノフェニルー 4、6-ジピリンの合成。

ベンズアルデヒドの代わりに4-シアノベンズアルデヒ ドを用いる他は、合成例1と同様の手法により、目的の 5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリンを得た。

【0048】(合成例3)2、3、7、8-テトラメチ ルー5-フェニルー4、6-ジピリンの合成。

ピロールの代わりに3、4ージメチルピロールを用いる 他は合成例1と同様の手法により、目的の2、3、7、 8-テトラメチル-5-フェニル-4、6-ジピリンを 得た。

【0049】(合成例4)2、3、7、8-テトラメチ ルー5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンの合 成。

ピロールの代わりに3、4ージメチルピロールを用いる 他は合成例2と同様の手法により、目的の2、3、7、 ジピリンを得た。

【0050】(合成例5)化学式[化3]で表される化 合物(トリ(5-フェニルー4、6-ジピリン)アルミ ニウム錯体)の合成。

|5-フェニルー4、6-ジピリンのトルエン溶液に塩化 アルミニウムを加え、8時間還流した。反応液を濃縮 後、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーによ り精製し、目的の化学式[化3]で表される化合物を得 た。

【0051】(合成例6)化学式 [化4] で表される化 30 り、目的の化学式 [化10] で表される化合物を得た。 合物(トリ(5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリ ン) アルミニウム錯体) の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンの代わりに、5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンを用いる他は、合成 例5と同様の手法により、目的の化学式[化4]で表さ れる化合物を得た。

【0052】(合成例7)化学式[化5]で表される化 合物(トリ(2、3、7、8ーテトラメチルー5ーフェ ニルー4、6-ジピリン)アルミニウム錯体)の合成。 5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、2、3、 7、8-テトラメチルー5-フェニルー4、6-ジピリ ンを用いる他は、合成例5と同様の手法により、目的の 化学式 [化5] で表される化合物を得た。

【0053】(合成例8)化学式[化6]で表される化 合物(トリ(2、3、7、8-テトラメチル-5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリン)アルミニウム錯 体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、2、3、 7、8-テトラメチルー5-p-シアノフェニルー4、

り、目的の化学式[化6]で表される化合物を得た。 【0054】(合成例9)化学式[化7]で表される化 合物(ジ(5-フェニルー4、6-ジピリン) 亜鉛錯 体)の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンのメタノール溶液に酢 酸亜鉛を加え、4時間還流した。反応液を濃縮後、シリ カゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより精製 し、目的の化学式[化7]で表される化合物を得た。

【0055】(合成例10)化学式[化8]で表される 10 化合物(ジ(5-p-シアノフェニル-4、6-ジピリ ン)亜鉛錯体)の合成。

5-フェニル-4、6-ジピリンの代わりに、5-p-シアノフェニルー4、6-ジピリンを用いる他は、合成 例9と同様の手法により、目的の化学式[化8]で表さ れる化合物を得た。

【0056】(合成例11)化学式[化9]で表される 化合物(ジ(2、3、7、8-テトラメチルー5-フェ ニルー4、6ージピリン) 亜鉛錯体) の合成。

5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、2、3、 8ーテトラメチルー5ーpーシアノフェニルー4、6-207、8ーテトラメチルー5ーフェニルー4、6ージピリ ンを用いる他は、合成例9と同様の手法により、目的の 化学式[化9]で表される化合物を得た。

> 【0057】(合成例12)化学式[化10]で表され る化合物(ジ(2、3、7、8-テトラメチル-5-p. ーシアノフェニルー4、6-ジピリン) 亜鉛錯体) の合

> 5-フェニルー4、6-ジピリンの代わりに、2、3、 **7、8-テトラメチル-5-p-シアノフェニル-4、** 6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法によ 【0058】以下、本発明の化合物を発光層として用い た実施例を実施例1から実施例25、実施例31から実 施例34に示す。また、本発明の化合物と正孔輸送材料 との混合薄膜を発光層として用いた実施例を実施例26

から実施例30に示す。また、本発明の化合物と電子輸 送材料との混合薄膜を発光層として用いた実施例を、以 下に記す実施例35から実施例39に、本発明の化合物 を正孔輸送層として用いた実施例を以下に記す実施例4 0から実施例41に、電子輸送層として用いた実施例を 40 以下に記す実施例42から実施例43に示す。

【0059】 (実施例1) 実施例1に用いた案子の断面 構造を図1に示す。以下に本発明の実施例1に用いる有 機薄膜EL素子の作製手順について説明する。素子は基 板1上に形成された陽極2/発光層4/陰極6により構 成されている。ガラス基板1上にITOをスパッタリン グによってシート抵抗が20Ω/口になるように製膜 し、陽極2とした。その陽極2上に発光層4として、化 学式[化3]で表される化合物を真空蒸着法にて40 n mの厚さに形成した。次に、発光層4上に、陰極6とし 6-ジピリンを用いる他は、合成例5と同様の手法によ 50 てマグネシウム-銀合金を真空蒸着法にて200nmの

厚さに形成して、有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を5V印加したところ、400cd/m²の発 光が得られた。

【0060】(実施例2)発光材料として、化学式〔化 4] で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の 操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流 電圧を5 V印加したところ、3 7 0 c d/m² の発光が 得られた。

【0061】(実施例3)発光材料として、化学式〔化 5] で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の 10 操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流 電圧を 5 V印加したところ、 6 5 0 c d/m² の発光が 得られた。

【0062】(実施例4)発光材料として、化学式[化 6] で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を5 V印加したところ、540 c d/m²の発光が得 られた。

【0063】(実施例5)発光材料として、化学式[化 操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流 電圧を5V印加したところ、350cd/m²の発光が 得られた。

【0064】(実施例6)発光材料として、化学式[化 18] で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の 操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流 電圧を5V印加したところ、300cd/m²の発光が 得られた。

【0065】(実施例7)発光材料として、化学式[化 9] で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の 30 操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流 電圧を5V印加したところ、380cd/m²の発光が 得られた。

【0066】(実施例8)発光材料として、化学式[化 - 10]で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様 の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直 流電圧を5V印加したところ、310cd/m²の発光 が得られた。

【0067】(実施例9)実施例9に用いた素子の断面 構造は図1に示されるように、基板1上に形成された陽 40 [化6]で表される化合物を用いる以外は実施例11と 極2/発光層4/陰極6により構成されている。以下に 本発明における実施例9に用いる有機薄膜EL素子の作 製手順について説明する。ガラス基板1上にITOをス パッタリングによってシート抵抗が20Ω/口になるよ うに製膜し、陽極2とした。その上に化学式 [化7] で 表される化合物のクロロホルム溶液を用いたスピンコー ト法により40nmの層厚を有する発光層4を形成し た。次に、発光層4の上に、陰極6としてマグネシウム 一銀合金を真空蒸着法により200nmの厚さに形成し て有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5 V 50

印加したところ、120cd/m²の発光が得られた。 【0068】(実施例10)化学式[化7]で表される 化合物の代わりに化学式 [化9] で表される化合物を用 いる他は実施例9と同様にして有機EL素子を作製し た。この素子に直流電圧を5V印加したところ、130 c d/m² の発光が得られた。

【0069】(実施例11)実施例11に用いた素子の 断面構造を図2に示す。素子は基板1上に形成された陽 極 2 / 正孔輸送層 3 / 発光層 4 / 電子輸送層 5 / 陰極 6 により構成されている。以下に本発明における実施例 1 1に用いる有機薄膜EL素子の作製手順について説明す る。ガラス基板1上にITOをスパッタリングによって シート抵抗が20Ω/口になるように製膜し、陽極2と した。その陽極2上に正孔輸送層3として、化学式「化 3] で表される、N, N'ージフェニルーN, N'ービ ス (3 - メチルフェニル) - [1, 1' - ピフェニル]-4. 4′-ジアミンを真空蒸着法にて50nmの厚さ に形成した。次に、正孔輸送層3上に発光層4として、 化学式[化3]で表される化合物を真空蒸着法にて40 7] で表される化合物を用いる以外は実施例1と同様の 20 nmの厚さに形成した。次に、発光層4上に、電子輸送 層 5 として、化学式 [化 1 7] で表される、 2 - (4 -ピフェニリル)-5-(4-t-プチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾールを真空蒸着法にて20n mの厚さに形成した。次に、電子輸送層5上に、陰極6. として、マグネシウム-銀合金を真空蒸着法によって2 00nmの厚さに形成して有機EL素子を作製した。こ の素子に直流電圧を10V印加したところ、2370c d/m²の発光が得られた。

> 【0070】(実施例12)発光材料として、化学式 [化4]で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、1860cd/m² の発光が得られた。

> 【0071】(実施例13)発光材料として、化学式 [化5]で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、2510cd/m² の発光が得られた。

> 【0072】 (実施例14) 発光材料として、化学式 同様の操作を行い有機EL索子を作製した。この案子に 直流電圧を10V印加したところ、1970cd/m² の発光が得られた。

> 【0073】 (実施例15) 発光材料として、化学式 [化7]で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、1260cd/m² の発光が得られた。

> 【0074】(実施例16)発光材料として、化学式 [化8] で表される化合物を用いる以外は実施例11と

同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、1070cd/m² の発光が得られた。

【0075】(実施例17)発光材料として、化学式 [化9] で表される化合物を用いる以外は実施例11と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、1380cd/m² の発光が得られた。

【0076】(実施例18)発光材料として、化学式 と同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子 に直流電圧を10V印加したところ、1110cd/m 2 の発光が得られた。

【0077】(実施例19)正孔輸送層3として、化学 式 [化13] で表される、N, N '-ジフェニル-N-N-ビス (1-ナフチル) -1, 1'-ビフェニル) -4.4 '-ジアミンを、電子輸送層5として、化学式 [化18] で表される化合物ピス {2-(4-t-ブチ) ルフェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール} -m-フェニレンを用いる以外は実施例11と同様の操作を行 20 れた。 い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、2240 c d/m² の発光が得られ た。

【0078】 (実施例20) 正孔輸送層3として、化学 式[化14]で表される化合物を、発光層4として、化 学式[化4]で表される化合物を、電子輸送層5とし て、化学式 [化21] で表される化合物を用いる以外は 実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製し た。この素子に直流電圧を10V印加したところ、16 80 c d/m² の発光が得られた。

【0079】 (実施例21) 正孔輸送層3として、化学 式[化15]で表される化合物を、発光層4として化学 式[化5]で表される化合物を、電子輸送層5として、 化学式 [化22] で表される化合物を用いる以外は、実 施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製し た。この素子に直流電圧を10V印加したところ、25 20 c d/m² の発光が得られた。

【0080】 (実施例22) 実施例22に用いた素子の 断面構造を図4に示す。素子は基板1上に形成された陽 ている。以下に本発明の実施例22に用いる有機薄膜 E し素子の作製手順について説明する。ガラス基板1上に ITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/ □になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上 に、発光層4として、化学式[化3]で表される化合物 を真空蒸着法にて40nmの厚さに形成した。次いで発 光層4の上に、電子輸送層5として、化学式[化19] で表される化合物を真空蒸着法にて50nmの厚さに形 成した。次に電子輸送層5の上に、陰極6として、マグー ネシウム-銀合金を200nmの厚さに形成してEL素 50 極2/発光層4/電子輸送層5/陰極6により構成され

子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したと ころ、1090cd/m² の発光が得られた。

【0081】 (実施例23) 発光層4に化学式 [化3] で表される化合物の代わりに、化学式 [化4] で表され る化合物を用いる以外は、実施例22と同様の操作を行 い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、960 c d/m² の発光が得られ った。

【0082】(実施例24)発光層4に化学式[化3] [化10] で表される化合物を用いる以外は実施例11 10 で表される化合物の代わりに、化学式 [化5] で表され る化合物を用いる以外は、を用いる以外は実施例22と 同様の操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に 直流電圧を10V印加したところ、1220cd/m² の発光が得られた。

> 【0083】(実施例25)発光層4に化学式[化3] で表される化合物の代わりに、化学式 [化6] で表され る化合物を用いる以外は、実施例22と同様の操作を行 い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、1020cd/m² の発光が得ら

【0084】 (実施例26) 発光層4として、化学式 [化13] で表される、N, N 'ージフェニルーN-N ーピス(1ーナフチル)ー1, 1'ーピフェニル)ー 4, 4 '-ジアミンと、化学式[化3]で表される化合 物を1:10の重量比で共蒸着して作製した薄膜を50 nmの厚さに形成する以外は、実施例22と同様の操作 を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を 10V印加したところ、1290cd/m²の発光が得 られた。

【0085】(実施例27)発光層4に化学式[化3] で表される化合物の代わりに、化学式「化4]で表され る化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行 い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、1060cd/m² の発光が得られ た。

【0086】(実施例28)発光層4に化学式[化3] で表される化合物の代わりに、化学式[化5]で表され る化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行 い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 極2/発光層4/電子輸送層5/陰極6により構成され 40 V印加したところ、1450cd/m²の発光が得られ た。

> 【0087】(実施例29)発光層4に化学式[化3] で表される化合物の代わりに、化学式[化6]で表され る化合物を用いる以外は、実施例26と同様の操作を行 い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、1170cd/m²の発光が得られ た。

> 【0088】(実施例30)実施例30に用いた素子の 断面構造を図4に示す。素子は基板1上に形成された陽

ている。以下に本発明の実施例30に用いる有機薄膜E L素子の作製手順について説明する。ガラス基板 1 上に ITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/ 口になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に 化学式 [化 6] で表される化合物と、化学式 [化 1 3] で表される、N, N 'ージフェニル-N-N-ピス(1 ーナフチル) -1, 1'ーピフェニル) -4, 4'ージ アミンをモル比で1:10の割合で含有するクロロホル ム溶液を用いたスピンコート法により40nmの厚さの 発光層4を形成した。次に、発光層4上に、化学式[化 10 11] で表される化合物を真空蒸着法により50nmの 厚さの電子輸送層5を形成し、その電子輸送層5上に陰 極6としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法により2 00nmの厚さに形成して有機EL素子を作製した。こ の素子に直流電圧を10V印加したところ、730cd /m² の発光が得られた。

[0089] (実施例31) 実施例31に用いた素子の 断面構造を図3に示す。素子は基板1上に形成された陽 極2/正孔輸送層3/発光層4/陰極6により構成され L素子の作製手順について説明する。ガラス基板 1 上に ITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω/ □になるように製膜し、陽極2とした。その陽極2上に 正孔輸送層3として、化学式[化13]で表される、 $N. N' - \mathcal{Y}$ $= \mathcal{Y}$ -1, 1'-ピフェニル)-4, 4 '-ジアミンからな る膜を真空蒸着法にて50nmの厚さに形成した。次 に、正孔輸送層3上に、発光層4として、化学式〔化 3]で表される化合物を真空蒸着した膜を40nmの厚 さに形成した。次に発光層4上に、陰極6としてマグネ 30 シウムー銀合金の層を200nmの厚さに形成してEL 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加した ところ、1820cd/m²の発光が得られた。

【0090】(実施例32)発光層4として、化学式 [化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化4] で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、1560cd/m²の発光 が得られた。

【0091】(実施例33)発光層4として、化学式 [化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化5] で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、2020cd/m²の発光 が得られた。

【0092】(実施例34)発光層4として、化学式 [化3]で表される化合物の代わりに、化学式[化6] で表される化合物を用いる以外は、実施例31と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10 V印加したところ、1760 c d / m² の発光 50 ところ、270 c d / m² の発光が得られた。

が得られた。

【0093】(実施例35)発光層4として、化学式 [化21] で表される化合物と、化学式 [化3] で表さ れる化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を 50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、2190cd/m²の発光 が得られた。

【0094】(実施例36)発光層4として、化学式 [化21] で表される化合物と、化学式[化4]で表さ れる化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を 50nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、1960cd/m²の発光 が得られた。

【0095】(実施例37)発光層4として、化学式 [化21] で表される化合物と、化学式 [化5] で表さ れる化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を 50 nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の ている。以下に本発明の実施例31に用いる有機薄膜E 20 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、2320cd/m²の発光 が得られた。

> 【0096】(実施例38)発光層4として、化学式 [化21] で表される化合物と、化学式 [化6] で表さ れる化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着した膜を 50 nmの厚さに形成する以外は、実施例31と同様の 操作を行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電 圧を10V印加したところ、2030cd/m²の発光 が得られた。

【0097】(実施例39)正孔輸送層3として、化学 式「化12]で表される、N、N′ージフェニルーN、 N' - UZ (3 - JF) - [1, 1' - UZ]ェニル] -4,41-ジアミンを、発光層4として、化 学式 [化23] で表される化合物と、化学式 [化6] で 表される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着して 作製した膜を用いる以外は、実施例31と同様の操作を 行い有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を1 0 V印加したところ、2080cd/m²の発光が得ら れた。

40 【0098】 (実施例40) 正孔輸送層3に含まれる正 孔輸送材料として、化学式 [化3] で表される化合物 を、発光層4として、化学式[化23]で表される化合 物を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い有機 EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加 したところ、240 c d/m²の発光が得られた。

【0099】(実施例41)正孔輸送層3に含まれる正 孔輸送材料として、化学式[化5]で表される化合物を 用いる以外は、実施例40と同様の操作を行い有機EL 素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加した

30

29

【0100】(実施例42)電子輸送層5として、化学式[化3]で表される化合物を用い、発光層4として化学式[化21]で表される化合物を用いる以外は、実施例11と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、760cd/m²の発光が得られた。

【0101】(実施例43)電子輸送層5として、化学式[化4]で表される化合物を用いる以外は、実施例42と同様の操作を行い、有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、890cd/10m²の発光が得られた。

[0102]

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明化合物を有機EL素子の構成材料とすることにより、従来に比べて

高輝度な発光が得られ、本発明の効果は大である。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の素子の断面図である。
- 【図2】本発明の素子の断面図である。
- 【図3】本発明の素子の断面図である。
- 【図4】本発明の素子の断面図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔輸送層
- 4 発光層
- 5 電子輸送層
- 6 陰極

フロントページの続き

(72)発明者 森岡 由紀子

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(72) 発明者 小田 敦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB02 CB01 CB03 DA00 DA01 DB03 EB00 FA01